

Anhang 2: Zusätzliche Tabelle

Tabelle S1: Kompetenzniveau im Gruppenvergleich

Hochgestellt: Anzahl Teilnehmende (Gruppe Appr. ≤ 5 J./Gruppe Appr. ≤ 13 J.)	Konnte ich...								Konnte ich nicht (grau hinterlegt, wenn>50%)	
	jemand anderem beibringen [%]		selbstständig durchführen [%]		wenn ich bei Bedarf Supervision hatte [%]		mit direkter Supervision [%]			
	Appr. ≤ 5 J.	Appr. ≤ 13 J.	Appr. ≤ 5 J.	Appr. ≤ 13 J.	Appr. ≤ 5 J.	Appr. <13 J.	Appr. ≤ 5 J.	Appr. ≤ 13 J.	Appr. ≤ 5 J.	Appr. ≤ 13 J.
Untersuchung										
Anaregion ^{47/91}	6,4 (n=3)	6,6 (n=6)	29,8 (n=14)	29,7 (n=27)	25,5 (n=12)	26,4 (n=24)	19,1 (n=9)	14,3 (n=13)	19,1 (n=9)	23,1 (n=21)
Extremitäten ^{47/89}	12,8 (n=6)	7,9 (n=7)	34,0 (n=16)	33,7 (n=30)	29,8 (n=14)	37,1 (n=33)	12,8 (n=6)	10,1 (n=9)	10,6 (n=5)	11,2 (n=10)
Wirbelsäule ^{46/87}	8,7 (n=4)	5,7 (n=5)	39,1 (n=18)	33,3 (n=29)	23,9 (n=11)	29,9 (n=26)	8,7 (n=4)	10,3 (n=9)	19,6 (n=9)	20,7 (n=18)
Augen ^{46/88}	/	1,1 (n=1)	15,2 (n=7)	13,6 (n=12)	17,4 (n=8)	13,6 (n=12)	23,9 (n=11)	21,6 (n=19)	43,5 (n=20)	50,0 (n=44)
Haut ^{46/89}	2,2 (n=1)	1,1 (n=1)	17,4 (n=8)	14,6 (n=13)	21,7 (n=10)	25,8 (n=23)	21,7 (n=10)	20,2 (n=18)	37,0 (n=17)	38,2 (n=34)
Nervensystem ^{47/89}	10,6 (n=5)	6,7 (n=6)	29,8 (n=14)	27,0 (n=24)	34,0 (n=16)	39,3 (n=35)	17,0 (n=8)	14,6 (n=13)	8,5 (n=4)	12,4 (n=11)
Männl. Genital inkl. Prostata ^{47/90}	2,1 (n=1)	2,2 (n=2)	4,3 (n=2)	4,4 (n=4)	17,0 (n=8)	18,9 (n=17)	12,8 (n=6)	15,6 (n=14)	63,8 (n=30)	58,9 (n=53)
Weibl.Brust und LK ^{46/90}	6,5 (n=3)	3,3 (n=3)	19,6 (n=9)	20,0 (n=18)	26,1 (n=12)	23,3 (n=21)	17,4 (n=8)	23,3 (n=21)	30,4 (n=14)	30,0 (n=27)
Weibl. Genital inkl. Spekulum ^{45/87}	/	/	2,2 (n=1)	1,1 (n=1)	2,2 (n=1)	1,1 (n=1)	13,3 (n=6)	17,2 (n=15)	82,2 (n=37)	80,5 (n=70)
Neugeborenes ^{46/88}	/	/	6,5 (n=3)	6,8 (n=6)	6,5 (n=3)	9,1 (n=8)	32,6 (n=15)	28,4 (n=25)	54,3 (n=25)	55,7 (n=49)
Säugling ^{46/88}	/	/	8,7 (n=4)	4,5 (n=4)	15,2 (n=7)	17,0 (n=15)	19,6 (n=9)	20,5 (n=18)	56,5 (n=26)	58,0 (n=51)
Kleinkind ^{47/90}	2,1 (n=1)	1,1 (n=1)	6,4 (n=3)	4,4 (n=4)	25,5 (n=12)	23,3 (n=21)	14,9 (n=7)	25,6 (n=23)	51,1 (n=24)	45,6 (n=41)
Gleichgewichtssinn ^{47/90}	8,5 (n=4)	5,6 (n=5)	31,9 (n=15)	40,0 (n=36)	25,5 (n=12)	22,2 (n=20)	21,3 (n=10)	15,6 (n=14)	12,8 (n=6)	16,7 (n=15)
Geriatrische Unters. &Testverfahren ^{45/88}	6,7 (n=3)	3,4 (n=3)	11,1 (n=5)	14,8 (n=13)	24,4 (n=11)	20,5 (n=18)	20,0 (n=9)	12,5 (n=11)	37,8 (n=17)	48,9 (n=43)
Durchführung										
Pricktests ^{43/86}	2,3 (n=1)	1,2 (n=1)	7,0 (n=3)	7,0 (n=6)	7,0 (n=3)	9,3 (n=8)	7,0 (n=3)	11,6 (n=10)	76,7 (n=33)	70,9 (n=61)
Intrakutantests ^{43/84}	/	/	2,3 (n=1)	3,6 (n=3)	/	3,6 (n=3)	7,0 (n=3)	6,0 (n=5)	90,7 (n=39)	86,9 (n=73)

Epikutantests ^{43/85}	/	/	4,7 (n=2)	4,7 (n=4)	/	4,7 (n=4)	11,6 (n=5)	7,1 (n=6)	83,7 (n=36)	83,5 (n=71)
Probengewinnung für Erregernachweis ^{46/88}	6,5 (n=3)	6,8 (n=6)	26,1 (n=12)	25,0 (n=22)	19,6 (n=9)	14,8 (n=13)	17,4 (n=8)	17,0 (n=15)	30,4 (n=14)	36,4 (n=32)
Lumbalpunktion ^{45/88}	/	/	4,4 (n=2)	2,3 (n=2)	6,7 (n=3)	3,4 (n=3)	8,9 (n=4)	25,0 (n=22)	80,0 (n=36)	69,3 (n=61)
Arterielle Blutabnahme ^{46/89}	8,7 (n=4)	7,9 (n=7)	19,6 (n=9)	18,0 (n=16)	10,9 (n=5)	13,5 (n=12)	23,9 (n=11)	20,2 (n=18)	37,0 (n=17)	40,4 (n=36)
Lokalanästhesie ^{47/89}	6,4 (n=3)	5,6 (n=5)	21,3 (n=10)	16,9 (n=15)	10,6 (n=5)	14,6 (n=13)	12,8 (n=6)	16,9 (n=15)	48,9 (n=23)	46,1 (n=41)
Immobilisationsmaßnahmen/Verbände ^{46/88}	6,5 (n=3)	8,0 (n=7)	19,6 (n=9)	21,6 (n=19)	17,4 (n=8)	13,6 (n=12)	21,7 (n=10)	21,6 (n=19)	34,8 (n=16)	35,2 (n=31)
Nasentamponade ^{46/88}	/	/	4,3 (n=2)	6,8 (n=6)	/	4,5 (n=4)	15,2 (n=7)	12,5 (n=11)	80,4 (n=37)	76,1 (n=67)
Ärztliche Leichenschau ^{45/89}	6,7 (n=3)	4,5 (n=4)	13,3 (n=6)	14,6 (n=13)	15,6 (n=7)	20,2 (n=18)	26,7 (n=12)	21,3 (n=19)	37,8 (n=17)	39,3 (n=35)
Anlage										
Transurethraler Blasenkatheter ^{46/89}	2,2 (n=1)	6,7 (n=6)	4,3 (n=2)	12,4 (n=11)	17,4 (n=8)	11,2 (n=10)	19,6 (n=9)	19,1 (n=17)	56,5 (n=26)	50,6 (n=45)
Magensonde ^{44/84}	2,3 (n=1)	4,8 (n=4)	4,5 (n=2)	7,1 (n=6)	6,8 (n=3)	7,1 (n=6)	27,3 (n=12)	26,2 (n=22)	59,1 (n=26)	54,8 (n=46)
Medikamentenapplikation										
Subkutan ^{47/89}	14,9 (n=7)	18,0 (n=16)	31,9 (n=15)	41,6 (n=37)	10,6 (n=5)	5,6 (n=5)	14,9 (n=7)	13,5 (n=12)	27,7 (n=13)	21,3 (n=19)
Intramuskulär ^{46/88}	15,2 (n=7)	13,6 (n=12)	28,3 (n=13)	28,4 (n=25)	19,6 (n=9)	19,3 (n=17)	4,3 (n=2)	9,1 (n=8)	32,6 (n=15)	29,5 (n=26)
Intravenös ^{47/91}	17,0 (n=8)	19,8 (n=18)	40,4 (n=19)	46,2 (n=42)	19,1 (n=9)	14,3 (n=13)	8,5 (n=4)	6,6 (n=6)	14,9 (n=7)	13,2 (n=12)
Nasal ^{44/85}	13,6 (n=6)	9,4 (n=8)	31,8 (n=14)	35,3 (n=30)	11,4 (n=5)	8,2 (n=7)	13,6 (n=6)	9,4 (n=8)	29,5 (n=13)	37,6 (n=32)
Kanthal ^{45/84}	2,2 (n=1)	1,2 (n=1)	6,7 (n=3)	4,8 (n=4)	2,2 (n=1)	2,4 (n=2)	6,7 (n=3)	4,8 (n=4)	82,2 (n=37)	86,9 (n=73)
Rektal ^{46/90}	10,9 (n=5)	10,0 (n=9)	37,0 (n=17)	43,3 (n=39)	6,5 (n=3)	8,9 (n=8)	10,9 (n=5)	8,9 (n=8)	34,8 (n=16)	28,9 (n=26)
Erklärung u. Demonstration										
Altersbezog.Vorgehen Viggoanlage ^{47/91}	31,9 (n=15)	26,4 (n=24)	46,8 (n=22)	50,5 (n=46)	2,1 (n=1)	4,4 (n=4)	8,5 (n=4)	6,6 (n=6)	10,6 (n=5)	12,1 (n=11)
therapeut.Einsatz Vernebler beim Kind ^{47/88}	4,3 (n=2)	4,5 (n=4)	10,6 (n=5)	10,2 (n=9)	10,6 (n=5)	8,0 (n=7)	10,6 (n=5)	8,0 (n=7)	63,8 (n=30)	69,3 (n=61)
Erfragen/Beschreiben u. Dokumentieren										
Selbst- u. Fremdgefährdung ^{46/88}	8,7 (n=4)	5,7 (n=5)	23,9 (n=11)	25,0 (n=22)	23,9 (n=11)	29,5 (n=26)	6,5 (n=3)	10,2 (n=9)	37,0 (n=17)	29,5 (n=26)
Psychopathol.Befund ^{46/89}	2,2 (n=1)	1,1 (n=1)	8,7 (n=4)	11,2 (n=10)	37,0 (n=17)	32,6 (n=29)	26,1 (n=12)	20,2 (n=18)	26,1 (n=12)	34,8 (n=31)